


Exposures negatively associated with uterine cancer risk

Exposure	# of studies	Sample size	Cases	Pooled RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	3	3,315	1,227	0.47 (0.32-0.69)
베타-카로틴	3	3,315	1,227	0.57 (0.43-0.76)
라이코펜	2	2,233	686	0.78 (0.5-1.21)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	4	66,026	2,398	0.81 (0.56-1.15)
비타민 B군				
엽산	2	74,680	412	0.47 (0.31-0.71)
무기질 및 미량 원소				
칼슘	4	6,240	1,445	0.66 (0.52-0.82)
폴리페놀 및 플라보노이드				
녹차	3	3,331	1,564	0.68 (0.48-0.95)
차	4	4,413	2,105	0.74 (0.45-1.21)
지방산 및 지질				
오메가-3 지방산	5	457,863	4,240	0.85 (0.62-1.16)
어유	3	110,943	2,072	0.87 (0.46-1.64)
식물성 에스트로겐				
대두	3	95,991	933	0.73 (0.46-1.13)
기타				
지중해식 식단	3	90,098	3,100	0.61 (0.34-1.09)
카페인	4	150,854	1,222	0.9 (0.73-1.12)
알코올	15	411,289	8,229	0.96 (0.85-1.08)



Exposure group

비타민 B군

카로티노이드

지방산 및 지질

무기질 및 미량 원소

기타

식물성 에스트로겐

폴리페놀 및 플라보노이드

비타민 A, C, D, E, K