


Exposures negatively associated with ovarian cancer risk

Exposure	# of studies	Sample size	Cases	Pooled RR (95% CI)
类胡萝卜素				
叶黄素	4	529,715	3,624	0.66 (0.45–0.98)
β-胡萝卜素	8	611,872	4,692	0.72 (0.57–0.91)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	6	591,029	4,497	0.66 (0.48–0.92)
维生素 C	3	583,089	2,528	0.71 (0.38–1.29)
维生素 D	11	68,361	5,262	0.72 (0.6–0.87)
维生素 A	6	1,588,466	9,351	0.97 (0.86–1.09)
B族维生素				
叶酸	8	723,200	3,495	0.76 (0.56–1.02)
抗氧化剂				
抗氧化剂	4	523,871	2,791	0.59 (0.36–0.99)
矿物质与微量元素				
硒	3	1,947	768	0.21 (0.05–0.92)
钙	5	37,261	2,041	0.72 (0.48–1.08)
多酚与黄酮类				
茶	8	307,213	4,002	0.77 (0.55–1.08)
水果与蔬菜				
豆类	2	63,479	506	0.58 (0.22–1.49)
脂肪酸与脂质				
Omega-6 脂肪酸	2	6,630	3,238	0.78 (0.67–0.9)
植物雌激素				
大豆	2	1,906	754	0.37 (0.22–0.64)
其他				
咖啡因	11	336,054	38,479	0.95 (0.79–1.15)
酒精	20	832,445	18,046	0.96 (0.82–1.12)



Exposure group

- 抗氧化剂
- B族维生素
- 类胡萝卜素
- 脂肪酸与脂质
- 水果与蔬菜
- 矿物质与微量元素
- 其他
- 植物雌激素
- 多酚与黄酮类
- 维生素 A、C、D、E、K

RR < 1 = inversely associated with ovarian cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to # of studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval