


Exposures positively associated with breast cancer risk
meta-analysis of dietary-intake studies

Exposure	# of studies	Sample size	Cases	Pooled RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 K	2	5,048	2,592	1.01 (0.68-1.5)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	6	175,826	12,809	1.02 (0.87-1.2)
철	8	385,425	22,415	1.22 (1.04-1.43)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	24	1,181,650	65,433	1.02 (0.93-1.13)
과일 및 채소				
자몽	2	164,504	5,404	1.1 (0.8-1.52)
지방산 및 지질				
공액리놀레산	4	380,443	17,329	1.06 (0.92-1.22)
오메가-6 지방산	2	2,476	1,201	1.74 (1.26-2.42)
기타				
달걀	8	29,311	5,421	1.19 (0.99-1.43)
알코올	185	16,045,202	1,276,703	1.24 (1.21-1.26)
붉은 고기	34	1,178,141	60,075	1.33 (1.24-1.42)



Exposure group

- 지방산 및 지질
- 과일 및 채소
- 무기질 및 미량 원소
- 기타
- 폴리페놀 및 플라보노이드
- 비타민 A, C, D, E, K

RR > 1 = positively associated with breast cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to # of studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval