
# 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 카로티노이드 | | | | |
| 라이코펜 | 3 | 216,679 | - | 0.67 (0.54–0.82) |
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 E | 4 | 114,280 | - | 0.64 (0.40–1.04) |
| 비타민 D | 7 | 45,247 | - | 0.74 (0.51–1.08) |
| 무기질 및 미량 원소 | | | | |
| 셀레늄 | 5 | 123,475 | - | 0.65 (0.37–1.12) |
| 아연 | 2 | 82,482 | - | 0.84 (0.17–4.29) |
| 폴리페놀 및 플라보노이드 | | | | |
| 차 | 2 | 192,116 | - | 0.74 (0.44–1.22) |
| 과일 및 채소 | | | | |
| 토마토 | 3 | 124,620 | - | 0.70 (0.54–0.90) |
| 기타 | | | | |
| 총 식이섬유 섭취 | 2 | 885,584 | 5,076 | 0.86 (0.63–1.17) |




RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.