
전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	2	1,623	677	0.65 (0.49–0.86)
베타-카로틴	10	94,949	-	0.79 (0.63–0.98)
라이코펜	13	282,888	-	0.85 (0.74–0.96)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 K	3	33,957	804	0.65 (0.39–1.06)
비타민 C	10	68,446	7,637	0.86 (0.73–1.01)
비타민 E	11	236,313	12,105	0.94 (0.85–1.04)
비타민 B군				
비타민 B6	2	27,767	1,598	0.84 (0.71–1.00)
엽산	5	131,386	-	0.89 (0.72–1.09)
폴리페놀 및 플라보노이드				
녹차	7	99,090	1,577	0.64 (0.46–0.89)
차	11	314,678	15,479	0.75 (0.64–0.88)
과일 및 채소				
마늘	3	36,604	2,168	0.69 (0.42–1.13)
토마토	13	1,105,953	70,792	0.76 (0.67–0.86)
콩류	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81–0.97)
지방산 및 지질				
에이코사펜타엔산	2	430,507	7,761	0.95 (0.77–1.16)
식물성 에스트로겐				
대두	8	85,059	5,399	0.60 (0.41–0.89)
제니스테인	3	70,911	727	0.78 (0.37–1.63)
허브 및 식물성 제품				
은행나무	2	38,308	1,665	0.93 (0.68–1.27)
대사산물 및 아미노산				
베타인	2	54,424	790	0.81 (0.48–1.38)
식이 단백질 섭취	3	238,471	3,788	0.94 (0.79–1.11)
식사 패턴				
식물성 식단	2	211,318	24,516	0.91 (0.84–0.99)
DASH 식단	2	152,714	-	0.93 (0.82–1.06)
기타				
불용성 식이섬유 섭취	3	101,084	-	0.62 (0.38–1.03)
수용성 식이섬유 섭취	3	80,888	10,851	0.89 (0.83–0.96)
총 식이섬유 섭취	7	972,077	17,079	0.91 (0.85–0.98)



RR < 1 = 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐