
与侵袭性前列腺癌风险呈正相关的暴露因素膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
矿物质与微量元素				
钙	5	98,670	-	1.62 (0.92-2.84)
脂肪酸与脂质				
α-亚麻酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03-3.31)
单不饱和脂肪（MUFA）	3	144,473	-	2.39 (1.37-4.15)
多不饱和脂肪（PUFA）	6	721,149	-	2.70 (1.10-6.80)
Omega-3 脂肪酸	5	720,112	4,355	3.43 (1.67-7.04)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
其他				
复合维生素	2	343,481	2,040	1.27 (1.04-1.56)
酒精	4	166,503	-	1.28 (0.73-2.26)
鸡蛋	2	869,756	5,123	1.36 (0.87-2.10)
乳制品	3	101,926	744	1.41 (1.14-1.75)
加工肉类摄入量	4	204,990	2,302	1.41 (1.21-1.65)
红肉	5	129,031	1,575	1.44 (1.13-1.84)



RR > 1 = 与侵袭性前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

无已发表的亚型基线风险：采用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例总数。