
与前列腺癌风险呈正相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 D	28	551,155	-	1.11 (1.05-1.18)
维生素 A	14	72,012	18,837	1.19 (0.99-1.42)
B 族维生素				
叶酸	10	157,607	-	1.02 (0.95-1.10)
维生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
抗氧化剂				
抗氧化剂	3	55,137	6,154	1.06 (0.81-1.38)
辅酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
矿物质与微量元素				
铜	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
铁	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
镁	3	44,056	6,498	1.05 (0.88-1.25)
钙	29	1,096,571	-	1.18 (1.09-1.27)
锌	12	96,718	7,983	1.18 (0.90-1.54)
矿物质补充剂	3	61,361	3,664	1.26 (0.99-1.61)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	4	29,924	751	1.44 (0.99-2.10)
脂肪酸与脂质				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
Omega-6 脂肪酸	11	559,516	12,359	1.01 (0.99-1.03)
Omega-3 脂肪酸	30	2,025,496	74,292	1.02 (0.98-1.07)
α-亚麻酸	9	605,566	16,695	1.25 (1.07-1.46)
多不饱和脂肪（PUFA）	46	2,649,800	-	1.37 (0.87-2.17)
单不饱和脂肪（MUFA）	10	257,768	-	1.57 (1.23-1.99)
代谢物与氨基酸				
甜菜碱	3	55,116	963	1.03 (0.60-1.74)
氨基葡萄糖	2	224,047	10,713	1.06 (1.01-1.11)
胆碱	3	8,815	1,545	1.38 (0.92-2.07)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
复合维生素	6	397,821	7,673	1.02 (0.96-1.09)
全谷物摄入量	4	81,716	7,551	1.05 (0.92-1.20)
加工肉类摄入量	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04-1.21)
鸡蛋	4	928,359	5,821	1.15 (0.94-1.41)
酒精	31	2,017,881	-	1.18 (1.09-1.28)
乳制品	25	779,857	33,256	1.23 (1.13-1.34)
超加工食品摄入量	2	4,030	1,979	1.39 (0.58-3.31)
红肉	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23-2.00)



暴露类别

类胡萝卜素 · 维生素 A、C、D、E、K · B 族维生素 · 抗氧化剂 · 矿物质与微量元素 · 发酵食品与益生菌 · 脂肪酸与脂质 · 代谢物与氨基酸 · 饮食模式 · 其他

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外