
与前列腺癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
玉米黄质	4	2,106	808	0.66 (0.40-1.08)
番茄红素	20	456,480	-	0.82 (0.74-0.91)
β-胡萝卜素	16	124,141	-	0.92 (0.78-1.09)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 K	3	33,957	804	0.65 (0.39-1.06)
维生素 C	11	68,944	7,699	0.87 (0.75-1.03)
维生素 E	23	370,730	35,780	0.93 (0.85-1.01)
B 族维生素				
维生素 B6	2	27,767	1,598	0.84 (0.71-1.00)
矿物质与微量元素				
硒	29	441,457	-	0.83 (0.72-0.96)
多酚与黄酮类				
绿茶	7	99,090	1,577	0.64 (0.46-0.89)
茶	11	314,678	15,479	0.75 (0.64-0.88)
水果与蔬菜				
大蒜	3	36,604	2,168	0.69 (0.42-1.13)
番茄	13	1,105,953	70,792	0.76 (0.67-0.86)
豆类	8	1,155,076	79,072	0.89 (0.81-0.97)
脂肪酸与脂质				
亚油酸	6	22,303	2,859	0.76 (0.55-1.04)
油酸	2	58,714	851	0.80 (0.24-2.64)
鱼油	2	37,289	1,735	0.89 (0.68-1.17)
二十二碳六烯酸	3	144,141	7,729	0.94 (0.74-1.20)
二十碳五烯酸	5	444,156	13,552	0.99 (0.88-1.12)
植物雌激素				
大豆	8	85,059	5,399	0.60 (0.41-0.89)
染料木黄酮	9	91,302	3,818	0.72 (0.54-0.95)
草本与植物制品				
银杏	2	38,308	1,665	0.93 (0.68-1.27)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	3	238,471	3,788	0.94 (0.79-1.11)
激素与内源性物质				
褪黑素	3	4,618	1,414	0.75 (0.45-1.23)
饮食模式				
植物性饮食	2	211,318	24,516	0.91 (0.84-0.99)
DASH饮食	2	152,714	-	0.93 (0.82-1.06)
其他				
不溶性膳食纤维摄入量	3	101,084	-	0.62 (0.38-1.03)
可溶性膳食纤维摄入量	3	80,888	10,851	0.89 (0.83-0.96)
总膳食纤维摄入量	7	972,077	17,079	0.91 (0.85-0.98)



暴露类别

- 类胡萝卜素
- 维生素 A、C、D、E、K
- B 族维生素
- 矿物质与微量元素
- 多酚与黄酮类
- 水果与蔬菜
- 脂肪酸与脂质
- 植物雌激素
- 草本与植物制品
- 代谢物与氨基酸
- 激素与内源性物质
- 饮食模式
- 其他

RR < 1 = 与前列腺癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外