
# 공격성 전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **무기질 및 미량 원소** | | | | |
| 칼슘 | 5 | 98,670 | - | 1.62 (0.92–2.84) |
| **지방산 및 지질** | | | | |
| 알파-리놀렌산 | 3 | 383,989 | 3,504 | 1.85 (1.03–3.31) |
| 단일불포화지방(MUFA) | 2 | 2,234 | - | 2.39 (1.37–4.15) |
| **식사 패턴** | | | | |
| 지중해식 식단 | 2 | 106,146 | - | 1.02 (0.92–1.13) |
| **기타** | | | | |
| 종합비타민 | 2 | 343,481 | 2,040 | 1.27 (1.04–1.56) |
| 알코올 | 4 | 166,503 | - | 1.28 (0.73–2.26) |
| 달걀 | 2 | 869,756 | 5,123 | 1.36 (0.87–2.10) |
| 유제품 | 3 | 101,926 | 744 | 1.41 (1.14–1.75) |
| 가공육 섭취 | 4 | 204,990 | 2,302 | 1.41 (1.21–1.65) |
| 붉은 고기 | 5 | 129,031 | 1,575 | 1.44 (1.13–1.84) |




RR > 1 = 공격성 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.