
전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	5	3,128	1,292	1.00 (0.63-1.61)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	28	551,155	-	1.11 (1.05-1.18)
비타민 A	14	72,012	18,837	1.19 (0.99-1.42)
비타민 B군				
엽산	10	157,607	-	1.02 (0.95-1.10)
비타민 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97-1.28)
항산화제				
항산화제	3	55,137	6,154	1.06 (0.81-1.38)
코엔자임 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79-1.79)
무기질 및 미량 원소				
구리	2	43,360	6,174	1.05 (1.00-1.11)
철	5	184,031	11,578	1.05 (0.94-1.16)
마그네슘	3	44,056	6,498	1.05 (0.88-1.25)
칼슘	29	1,096,571	-	1.18 (1.09-1.27)
아연	12	96,718	7,983	1.18 (0.90-1.54)
미네랄 보충제	3	61,361	3,664	1.26 (0.99-1.61)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
발효식품	4	29,924	751	1.44 (0.99-2.10)
지방산 및 지질				
도코사펜타엔산(오메가-3)	2	143,344	7,412	1.00 (0.97-1.03)
오메가-6 지방산	3	507,381	8,548	1.01 (0.99-1.03)
오메가-3 지방산	11	688,289	28,904	1.02 (0.98-1.07)
알파-리놀렌산	9	605,566	16,695	1.25 (1.07-1.46)
다중불포화지방(PUFA)	5	64,788	-	1.37 (0.87-2.17)
단일불포화지방(MUFA)	7	56,815	-	1.57 (1.23-1.99)
대사산물 및 아미노산				
베타인	3	55,116	963	1.03 (0.60-1.74)
글루코사민	2	224,047	10,713	1.06 (1.01-1.11)
콜린	3	8,815	1,545	1.38 (0.92-2.07)
식사 패턴				
지중해식 식단	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
기타				
종합비타민	6	397,821	7,673	1.02 (0.96-1.09)
통곡물 섭취	4	81,716	7,551	1.05 (0.92-1.20)
가공육 섭취	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04-1.21)
달걀	4	928,359	5,821	1.15 (0.94-1.41)
알코올	31	2,017,881	-	1.18 (1.09-1.28)
유제품	25	779,857	33,256	1.23 (1.13-1.34)
초가공식품 섭취	2	4,030	1,979	1.39 (0.58-3.31)
붉은 고기	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23-2.00)



노출 요인군
카로티노이드
비타민 A, C, D, E, K
비타민 B군
항산화제
무기질 및 미량 원소
발효 식품 및 프로바이오틱스
지방산 및 지질
대사산물 및 아미노산
식사 패턴
기타

RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No