
# 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| 비타민 A, C, D, E, K | | | | |
| 비타민 E | 2 | 83,022 | 355 | 0.76 (0.29–1.94) |
| 무기질 및 미량 원소 | | | | |
| 아연 | 2 | 82,482 | - | 0.84 (0.17–4.29) |
| 폴리페놀 및 플라보노이드 | | | | |
| 차 | 2 | 192,116 | - | 0.74 (0.44–1.22) |
| 과일 및 채소 | | | | |
| 토마토 | 3 | 124,620 | - | 0.70 (0.54–0.90) |
| 대사산물 및 아미노산 | | | | |
| 베타인 | 2 | 54,424 | 790 | 0.81 (0.48–1.38) |
| 기타 | | | | |
| 총 식이섬유 섭취 | 2 | 885,584 | 5,076 | 0.86 (0.63–1.17) |




RR < 1 = 공격성 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간

Include subexposures: No

발표된 아형 기저 위험 없음: HR ≈ RR ≈ OR 근사. 누락된 증례 수는 추정하지 않습니다.