
与前列腺癌风险呈正相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	研究数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
维生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
B 族维生素				
维生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
矿物质与微量元素				
铁	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
锌	9	94,876	7,312	1.18 (0.92-1.51)
钙	20	817,818	-	1.22 (1.11-1.34)
矿物质补充剂	3	61,361	3,664	1.26 (0.99-1.61)
发酵食品与益生菌				
酸奶	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
发酵食品	4	29,924	751	1.44 (0.99-2.10)
脂肪酸与脂质				
Omega-3 脂肪酸	4	146,440	8,609	1.04 (0.85-1.28)
α-亚麻酸	7	604,221	16,199	1.25 (1.06-1.47)
单不饱和脂肪（MUFA）	5	54,911	-	1.47 (1.12-1.93)
多不饱和脂肪（PUFA）	4	63,836	-	1.74 (1.09-2.77)
饮食模式				
地中海饮食	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
西方膳食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
其他				
全谷物摄入量	4	81,716	7,551	1.05 (0.92-1.20)
加工肉类摄入量	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04-1.21)
复合维生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98-1.33)
鸡蛋	4	928,359	5,821	1.15 (0.94-1.41)
酒精	31	2,017,881	-	1.18 (1.09-1.28)
乳制品	25	779,857	33,256	1.23 (1.13-1.34)
超加工食品摄入量	2	4,030	1,979	1.39 (0.58-3.31)
红肉	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23-2.00)



暴露类别
维生素 A、C、D、E、K
矿物质与微量元素
脂肪酸与脂质
饮食模式
其他
B 族维生素
发酵食品与益生菌

RR > 1 = 与前列腺癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映研究数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No