
與前列腺癌風險呈正相關的暴露因子

暴露因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
葉黃素	5	3,128	1,292	1.00 (0.63–1.61)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 D	28	551,155	–	1.11 (1.05–1.18)
維生素 A	14	72,012	18,837	1.19 (0.99–1.42)
B 群維生素				
葉酸	10	157,607	–	1.02 (0.95–1.10)
維生素 B12	5	5,961	2,681	1.12 (0.97–1.28)
抗氧化劑				
抗氧化劑	3	55,137	6,154	1.06 (0.81–1.38)
輔酶 Q10	3	36,416	2,065	1.19 (0.79–1.79)
礦物質與微量元素				
銅	2	43,360	6,174	1.05 (1.00–1.11)
鐵	5	184,031	11,578	1.05 (0.94–1.16)
鎂	3	44,056	6,498	1.05 (0.88–1.25)
鈣	29	1,096,571	–	1.18 (1.09–1.27)
鋅	12	96,718	7,983	1.18 (0.90–1.54)
礦物質補充品	3	61,361	3,664	1.26 (0.99–1.61)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
發酵食品	4	29,924	751	1.44 (0.99–2.10)
脂肪酸與脂質				
二十二碳五烯酸（ω-3）	2	143,344	7,412	1.00 (0.97–1.03)
Omega-6 脂肪酸	3	507,381	8,548	1.01 (0.99–1.03)
Omega-3 脂肪酸	11	688,289	28,904	1.02 (0.98–1.07)
α-亞麻酸	9	605,566	16,695	1.25 (1.07–1.46)
多元不飽和脂肪（PUFA）	5	64,788	–	1.37 (0.87–2.17)
單元不飽和脂肪（MUFA）	7	56,815	–	1.57 (1.23–1.99)
代謝物與胺基酸				
甜菜鹼	3	55,116	963	1.03 (0.60–1.74)
葡萄糖胺	2	224,047	10,713	1.06 (1.01–1.11)
膽鹼	3	8,815	1,545	1.38 (0.92–2.07)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	–	1.02 (0.92–1.13)
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
綜合維生素	6	397,821	7,673	1.02 (0.96–1.09)
全穀物攝取量	4	81,716	7,551	1.05 (0.92–1.20)
加工肉類攝取量	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04–1.21)
雞蛋	4	928,359	5,821	1.15 (0.94–1.41)
酒精	31	2,017,881	–	1.18 (1.09–1.28)
乳製品	25	779,857	33,256	1.23 (1.13–1.34)
超加工食品攝取量	2	4,030	1,979	1.39 (0.58–3.31)
紅肉	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23–2.00)



暴露類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 抗氧化劑 · 礦物質與微量元素 · 發酵食品與益生菌 · 脂肪酸與脂質 · 代謝物與胺基酸 · 飲食模式 · 其他

RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No