
# 與前列腺癌風險呈正相關的暴露因子
# 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 維生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 維生素 A | 5 | 3,207 | 1,358 | 1.12 (0.63–1.99) |
| 維生素 D | 3 | 247,791 | 29,373 | 1.34 (0.90–2.01) |
| B 群維生素 | | | | |
| 維生素 B12 | 2 | 719 | 245 | 1.47 (1.02–2.12) |
| 礦物質與微量元素 | | | | |
| 鐵 | 4 | 183,783 | 11,462 | 1.02 (0.94–1.10) |
| 硒 | 10 | 235,441 | 18,652 | 1.02 (0.93–1.12) |
| 鋅 | 9 | 94,876 | 7,312 | 1.18 (0.92–1.51) |
| 鈣 | 20 | 817,818 | – | 1.22 (1.11–1.34) |
| 礦物質補充品 | 3 | 61,361 | 3,664 | 1.26 (0.99–1.61) |
| 發酵食品與益生菌 | | | | |
| 優格 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00–1.56) |
| 發酵食品 | 4 | 29,924 | 751 | 1.44 (0.99–2.10) |
| 脂肪酸與脂質 | | | | |
| Omega–3 脂肪酸 | 4 | 146,440 | 8,609 | 1.04 (0.85–1.28) |
| α–亞麻酸 | 7 | 604,221 | 16,199 | 1.25 (1.06–1.47) |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 5 | 54,911 | – | 1.47 (1.12–1.93) |
| 多元不飽和脂肪（PUFA） | 4 | 63,836 | – | 1.74 (1.09–2.77) |
| 飲食模式 | | | | |
| 地中海飲食 | 2 | 106,146 | – | 1.02 (0.92–1.13) |
| 西方飲食模式 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00–1.82) |
| 其他 | | | | |
| 全穀物攝取量 | 4 | 81,716 | 7,551 | 1.05 (0.92–1.20) |
| 加工肉類攝取量 | 10 | 1,060,983 | 65,260 | 1.12 (1.04–1.21) |
| 綜合維生素 | 4 | 348,954 | 4,443 | 1.14 (0.98–1.33) |
| 雞蛋 | 4 | 928,359 | 5,821 | 1.15 (0.94–1.41) |
| 酒精 | 31 | 2,017,881 | – | 1.18 (1.09–1.28) |
| 乳製品 | 25 | 779,857 | 33,256 | 1.23 (1.13–1.34) |
| 超加工食品攝取量 | 2 | 4,030 | 1,979 | 1.39 (0.58–3.31) |
| 紅肉 | 16 | 1,002,565 | 58,004 | 1.57 (1.23–2.00) |




RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No