
# 與前列腺癌風險呈負相關的暴露因子

| 暴露因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 類胡蘿蔔素 | | | | |
| 玉米黃素 | 4 | 2,106 | 808 | 0.66 (0.40–1.08) |
| 茄紅素 | 20 | 456,480 | – | 0.82 (0.74–0.91) |
| β–胡蘿蔔素 | 16 | 124,141 | – | 0.92 (0.78–1.09) |
| 維生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 維生素 C | 11 | 68,944 | 7,699 | 0.87 (0.75–1.03) |
| 維生素 E | 23 | 370,730 | 35,780 | 0.93 (0.85–1.01) |
| B 群維生素 | | | | |
| 維生素 B6 | 2 | 27,767 | 1,598 | 0.84 (0.71–1.00) |
| 礦物質與微量元素 | | | | |
| 硒 | 29 | 441,457 | – | 0.83 (0.72–0.96) |
| 多酚與類黃酮 | | | | |
| 綠茶 | 7 | 99,090 | 1,577 | 0.64 (0.46–0.89) |
| 茶 | 11 | 314,678 | 15,479 | 0.75 (0.64–0.88) |
| 水果與蔬菜 | | | | |
| 大蒜 | 3 | 36,604 | 2,168 | 0.69 (0.42–1.13) |
| 番茄 | 13 | 1,105,953 | 70,792 | 0.76 (0.67–0.86) |
| 豆類 | 8 | 1,155,076 | 79,072 | 0.89 (0.81–0.97) |
| 脂肪酸與脂質 | | | | |
| 亞油酸 | 6 | 22,303 | 2,859 | 0.76 (0.55–1.04) |
| 油酸 | 2 | 58,714 | 851 | 0.80 (0.24–2.64) |
| 魚油 | 2 | 37,289 | 1,735 | 0.89 (0.68–1.17) |
| 二十二碳六烯酸 | 3 | 144,141 | 7,729 | 0.94 (0.74–1.20) |
| 二十碳五烯酸 | 5 | 444,156 | 13,552 | 0.99 (0.88–1.12) |
| 植物雌激素 | | | | |
| 黃豆 | 8 | 85,059 | 5,399 | 0.60 (0.41–0.89) |
| 染料木黃酮 | 9 | 91,302 | 3,818 | 0.72 (0.54–0.95) |
| 草本與植物製品 | | | | |
| 銀杏 | 2 | 38,308 | 1,665 | 0.93 (0.68–1.27) |
| 代謝物與胺基酸 | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 3 | 238,471 | 3,788 | 0.94 (0.79–1.11) |
| 荷爾蒙與內源性物質 | | | | |
| 褪黑激素 | 3 | 4,618 | 1,414 | 0.75 (0.45–1.23) |
| 飲食模式 | | | | |
| 植物性飲食 | 2 | 211,318 | 24,516 | 0.91 (0.84–0.99) |
| DASH飲食 | 2 | 152,714 | – | 0.93 (0.82–1.06) |
| 其他 | | | | |
| 非水溶性膳食纖維攝取量 | 3 | 101,084 | – | 0.62 (0.38–1.03) |
| 水溶性膳食纖維攝取量 | 3 | 80,888 | 10,851 | 0.89 (0.83–0.96) |
| 總膳食纖維攝取量 | 7 | 972,077 | 17,079 | 0.91 (0.85–0.98) |




暴露類別

類胡蘿蔔素 · 維生素 A、C、D、E、K · B 群維生素 · 礦物質與微量元素 · 多酚與類黃酮 · 水果與蔬菜 · 脂肪酸與脂質 · 植物雌激素 · 草本與植物製品 · 代謝物與胺基酸 · 荷爾蒙與內源性物質 · 飲食模式 · 其他

RR < 1 = 與前列腺癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No