
전립선암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	연구 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63-1.99)
비타민 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90-2.01)
비타민 B군				
비타민 B12	2	719	245	1.47 (1.02-2.12)
무기질 및 미량 원소				
철	4	183,783	11,462	1.02 (0.94-1.10)
셀레늄	10	235,441	18,652	1.02 (0.93-1.12)
아연	9	94,876	7,312	1.18 (0.92-1.51)
칼슘	20	817,818	-	1.22 (1.11-1.34)
미네랄 보충제	3	61,361	3,664	1.26 (0.99-1.61)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	3	201,324	7,680	1.25 (1.00-1.56)
발효식품	4	29,924	751	1.44 (0.99-2.10)
지방산 및 지질				
오메가-3 지방산	9	654,940	24,234	1.06 (0.97-1.17)
오메가-9 지방산	2	200,518	7,678	1.08 (0.84-1.40)
다중불포화지방(PUFA)	14	721,521	-	1.19 (1.07-1.33)
알파-리놀렌산	7	604,221	16,199	1.25 (1.06-1.47)
단일불포화지방(MUFA)	7	255,429	-	1.27 (1.08-1.48)
식사 패턴				
지중해식 식단	2	106,146	-	1.02 (0.92-1.13)
서구식 식이 패턴	2	44,462	1,702	1.35 (1.00-1.82)
기타				
통곡물 섭취	4	81,716	7,551	1.05 (0.92-1.20)
가공육 섭취	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04-1.21)
종합비타민	4	348,954	4,443	1.14 (0.98-1.33)
달걀	4	928,359	5,821	1.15 (0.94-1.41)
알코올	31	2,017,881	-	1.18 (1.09-1.28)
유제품	25	779,857	33,256	1.23 (1.13-1.34)
초가공식품 섭취	2	4,030	1,979	1.39 (0.58-3.31)
붉은 고기	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23-2.00)



RR > 1 = 전립선암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes