
# 전립선암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

| 노출 요인 | 연구 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **카로티노이드** | | | | |
| 제아잔틴 | 4 | 2,106 | 808 | 0.66 (0.40–1.08) |
| 라이코펜 | 20 | 456,480 | - | 0.82 (0.74–0.91) |
| 베타-카로틴 | 16 | 124,141 | - | 0.92 (0.78–1.09) |
| **비타민 A, C, D, E, K** | | | | |
| 비타민 C | 11 | 68,944 | 7,699 | 0.87 (0.75–1.03) |
| 비타민 E | 23 | 370,730 | 35,780 | 0.93 (0.85–1.01) |
| **비타민 B군** | | | | |
| 비타민 B6 | 2 | 27,767 | 1,598 | 0.84 (0.71–1.00) |
| **무기질 및 미량 원소** | | | | |
| 셀레늄 | 29 | 441,457 | - | 0.83 (0.72–0.96) |
| **폴리페놀 및 플라보노이드** | | | | |
| 녹차 | 7 | 99,090 | 1,577 | 0.64 (0.46–0.89) |
| 차 | 11 | 314,678 | 15,479 | 0.75 (0.64–0.88) |
| **과일 및 채소** | | | | |
| 마늘 | 3 | 36,604 | 2,168 | 0.69 (0.42–1.13) |
| 토마토 | 13 | 1,105,953 | 70,792 | 0.76 (0.67–0.86) |
| 콩류 | 8 | 1,155,076 | 79,072 | 0.89 (0.81–0.97) |
| **지방산 및 지질** | | | | |
| 리놀레산 | 6 | 22,303 | 2,859 | 0.76 (0.55–1.04) |
| 올레산 | 2 | 58,714 | 851 | 0.80 (0.24–2.64) |
| 어유 | 2 | 37,289 | 1,735 | 0.89 (0.68–1.17) |
| 도코사헥사엔산 | 3 | 144,141 | 7,729 | 0.94 (0.74–1.20) |
| 오메가-6 지방산 | 9 | 529,684 | 11,407 | 0.98 (0.91–1.05) |
| 오메가-9 지방산 | 3 | 200,953 | 7,887 | 0.98 (0.65–1.47) |
| 에이코사펜타엔산 | 5 | 444,156 | 13,552 | 0.99 (0.88–1.12) |
| **식물성 에스트로겐** | | | | |
| 대두 | 8 | 85,059 | 5,399 | 0.60 (0.41–0.89) |
| 제니스테인 | 9 | 91,302 | 3,818 | 0.72 (0.54–0.95) |
| **허브 및 식물성 제품** | | | | |
| 은행나무 | 2 | 38,308 | 1,665 | 0.93 (0.68–1.27) |
| **대사산물 및 아미노산** | | | | |
| 식이 단백질 섭취 | 3 | 238,471 | 3,788 | 0.94 (0.79–1.11) |
| **호르몬 및 내인성 물질** | | | | |
| 멜라토닌 | 3 | 4,618 | 1,414 | 0.75 (0.45–1.23) |
| **식사 패턴** | | | | |
| 식물성 식단 | 2 | 211,318 | 24,516 | 0.91 (0.84–0.99) |
| DASH 식단 | 2 | 152,714 | - | 0.93 (0.82–1.06) |
| **기타** | | | | |
| 불용성 식이섬유 섭취 | 3 | 101,084 | - | 0.62 (0.38–1.03) |
| 수용성 식이섬유 섭취 | 3 | 80,888 | 10,851 | 0.89 (0.83–0.96) |
| 총 식이섬유 섭취 | 7 | 972,077 | 17,079 | 0.91 (0.85–0.98) |




노출 요인군

카로티노이드 · 비타민 A, C, D, E, K · 비타민 B군 · 무기질 및 미량 원소 · 폴리페놀 및 플라보노이드 · 과일 및 채소 · 지방산 및 지질 · 식물성 에스트로겐 · 허브 및 식물성 제품 · 대사산물 및 아미노산 · 호르몬 및 내인성 물질 · 식사 패턴 · 기타

RR < 1 = 전립선암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 연구 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes