
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Calcium	5	98,670	-	*1.62 (0.92-2.84)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Enkelvoudig onverzadigd vet (MUFA)	3	144,473	-	*1.72 (0.85-3.51)*
Alfa-linoleenzuur	3	383,989	3,504	*1.85 (1.03-3.31)*
Omega 3-vetzuren	3	383,989	3,504	*1.85 (1.03-3.31)*
Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)	4	385,026	-	*1.97 (1.16-3.35)*
VOEDINGSPATRONEN				
Mediterraan dieet	2	106,146	-	*1.02 (0.92-1.13)*
OVERIG				
Multivitaminen	2	343,481	2,040	*1.27 (1.04-1.56)*
Alcohol	4	166,503	-	*1.28 (0.73-2.26)*
Eieren	2	869,756	5,123	*1.36 (0.87-2.10)*
Zuivel	3	101,926	744	*1.41 (1.14-1.75)*
Inname van bewerkt vlees	4	204,990	2,302	*1.41 (1.21-1.65)*
Rood vlees	5	129,031	1,575	*1.44 (1.13-1.84)*



RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.