
與前列腺癌風險呈正相關的暴露因子
膳食攝取研究的統合分析

暴露因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	5	3,207	1,358	1.12 (0.63–1.99)
維生素 D	3	247,791	29,373	1.34 (0.90–2.01)
B 群維生素				
維生素 B12	2	719	245	1.47 (1.02–2.12)
礦物質與微量元素				
鐵	4	183,783	11,462	1.02 (0.94–1.10)
硒	10	235,441	18,652	1.02 (0.93–1.12)
鋅	9	94,876	7,312	1.18 (0.92–1.51)
鈣	20	817,818	–	1.22 (1.11–1.34)
礦物質補充品	3	61,361	3,664	1.26 (0.99–1.61)
發酵食品與益生菌				
優格	3	201,324	7,680	1.25 (1.00–1.56)
發酵食品	4	29,924	751	1.44 (0.99–2.10)
脂肪酸與脂質				
Omega–3 脂肪酸	9	654,940	24,234	1.06 (0.97–1.17)
Omega–9 脂肪酸	2	200,518	7,678	1.08 (0.84–1.40)
多元不飽和脂肪（PUFA）	14	721,521	–	1.19 (1.07–1.33)
α–亞麻酸	7	604,221	16,199	1.25 (1.06–1.47)
單元不飽和脂肪（MUFA）	7	255,429	–	1.27 (1.08–1.48)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	–	1.02 (0.92–1.13)
西方飲食模式	2	44,462	1,702	1.35 (1.00–1.82)
其他				
全穀物攝取量	4	81,716	7,551	1.05 (0.92–1.20)
加工肉類攝取量	10	1,060,983	65,260	1.12 (1.04–1.21)
綜合維生素	4	348,954	4,443	1.14 (0.98–1.33)
雞蛋	4	928,359	5,821	1.15 (0.94–1.41)
酒精	31	2,017,881	–	1.18 (1.09–1.28)
乳製品	25	779,857	33,256	1.23 (1.13–1.34)
超加工食品攝取量	2	4,030	1,979	1.39 (0.58–3.31)
紅肉	16	1,002,565	58,004	1.57 (1.23–2.00)



RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes