
신장 및 신우암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
무기질 및 미량 원소				
구리	2	95,958	353	2.44 (0.43–13.84)
대사산물 및 아미노산				
식이 단백질 섭취	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.24)
기타				
가당음료 섭취	3	563,999	1,503	1.11 (0.96–1.28)
초가공식품 섭취	2	582,035	3,740	1.22 (1.03–1.45)
가공육 섭취	3	991,425	2,649	1.23 (1.05–1.44)
붉은 고기	4	986,845	3,043	1.75 (1.22–2.53)
유제품	3	3,506	1,009	2.76 (1.23–6.20)



RR > 1 = 신장 및 신우암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No