
與膀胱癌風險呈負相關的暴露因子

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
β-胡蘿蔔素	2	57,269	1,178	0.69 (0.45–1.08)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	1,442	648	0.56 (0.41–0.76)
維生素 C	2	4,359	831	0.68 (0.43–1.07)
維生素 D	8	338,611	3,073	0.87 (0.40–1.90)
維生素 E	4	37,447	1,364	0.90 (0.85–0.96)
B 群維生素				
葉酸	2	2,508	1,233	0.65 (0.36–1.17)
維生素 B1	2	533,488	3,237	0.91 (0.52–1.60)
礦物質與微量元素				
硒	6	158,571	1,885	0.79 (0.60–1.05)
水果與蔬菜				
豆類	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
酪梨	2	112,328	110	0.78 (0.60–1.01)
發酵食品與益生菌				
發酵食品	2	82,627	665	0.62 (0.48–0.80)
代謝物與胺基酸				
植物性蛋白質攝取量	2	903,751	2,856	0.82 (0.72–0.93)
飲食模式				
DASH飲食	3	187,282	380	0.61 (0.30–1.23)
地中海飲食	6	1,536,289	8,379	0.86 (0.77–0.97)
其他				
全穀物攝取量	3	576,212	3,892	0.72 (0.52–1.01)
乳製品	6	186,061	2,176	0.78 (0.53–1.13)
總膳食纖維攝取量	2	676,447	3,990	0.85 (0.76–0.95)
酒精	8	950,368	6,562	0.94 (0.79–1.12)



RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No