
与肾和肾盂癌风险呈正相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 D	3	327,723	1,577	1.15 (0.58–2.30)
矿物质与微量元素				
铜	2	95,958	353	2.44 (0.43–13.84)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	776,349	2,168	1.30 (0.76–2.24)
其他				
含糖饮料摄入量	3	563,999	1,503	1.11 (0.96–1.28)
超加工食品摄入量	2	582,035	3,740	1.22 (1.03–1.45)
加工肉类摄入量	3	991,425	2,649	1.23 (1.05–1.44)
红肉	4	986,845	3,043	1.75 (1.22–2.53)
乳制品	3	3,506	1,009	2.76 (1.23–6.20)



RR > 1 = 与肾和肾盂癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No