
与膀胱癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	2	4,359	831	0.68 (0.43–1.07)
维生素 E	3	36,672	978	0.80 (0.60–1.05)
B 族维生素				
维生素 B1	2	533,488	3,237	0.91 (0.52–1.60)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
牛油果	2	112,328	110	0.78 (0.60–1.01)
发酵食品与益生菌				
发酵食品	2	82,627	665	0.62 (0.48–0.80)
代谢物与氨基酸				
植物蛋白质摄入量	2	903,751	2,856	0.82 (0.72–0.93)
饮食模式				
DASH饮食	3	187,282	380	0.61 (0.30–1.23)
地中海饮食	6	1,536,289	8,379	0.86 (0.77–0.97)
其他				
全谷物摄入量	3	576,212	3,892	0.72 (0.52–1.01)
乳制品	6	186,061	2,176	0.78 (0.53–1.13)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.76–0.95)
酒精	8	950,368	6,562	0.94 (0.79–1.12)



RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No