
与肾和肾盂癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
β-胡萝卜素	5	881,922	4,765	0.76 (0.64–0.90)
叶黄素	4	879,626	3,623	0.80 (0.69–0.91)
番茄红素	3	873,444	2,860	0.84 (0.59–1.22)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	2	4,597	1,909	0.66 (0.44–0.99)
维生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
维生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
维生素 D	8	510,406	3,672	0.85 (0.61–1.19)
B 族维生素				
维生素 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47–0.85)
叶酸	6	132,098	3,299	0.65 (0.48–0.89)
维生素 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55–0.92)
维生素 B6	3	3,861	1,547	0.75 (0.40–1.40)
维生素 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68–1.04)
矿物质与微量元素				
硒	2	3,471	1,543	0.26 (0.08–0.92)
钙	2	2,274	931	0.62 (0.16–2.39)
多酚与黄酮类				
绿茶	2	103,012	536	0.51 (0.24–1.11)
茶	5	907,106	3,147	0.73 (0.56–0.96)
代谢物与氨基酸				
胆碱	2	616,865	2,286	0.94 (0.84–1.06)
其他				
酒精	24	4,606,074	15,007	0.84 (0.76–0.93)
总膳食纤维摄入量	3	198,798	2,632	0.87 (0.78–0.97)



RR < 1 = 与肾和肾盂癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No