
與腎細胞癌風險呈負相關的暴露因子
膳食攝取研究的統合分析

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
β-胡蘿蔔素	5	881,922	4,765	0.75 (0.64–0.90)
葉黃素	4	879,626	3,623	0.80 (0.69–0.91)
茄紅素	3	873,444	2,860	0.84 (0.59–1.22)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 A	2	4,597	1,909	0.65 (0.43–0.99)
維生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
維生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
維生素 D	2	4,113	1,544	0.79 (0.65–0.95)
B 群維生素				
維生素 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55–0.92)
葉酸	3	129,691	2,345	0.78 (0.64–0.96)
多酚與類黃酮				
茶	4	804,643	2,861	0.72 (0.52–1.01)
其他				
酒精	16	3,497,583	8,299	0.80 (0.74–0.86)
總膳食纖維攝取量	2	4,410	1,621	0.85 (0.64–1.12)



RR < 1 = 與腎細胞癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No