
방광암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 D	2	324,171	656	1.72 (0.21–13.86)
무기질 및 미량 원소				
인	2	1,136	520	1.19 (0.47–3.01)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	5	39,321	4,484	1.05 (0.72–1.53)
식물성 에스트로겐				
대두	3	49,061	222	1.12 (0.31–4.00)
대사산물 및 아미노산				
동물성 단백질 섭취	2	903,751	2,856	1.14 (1.03–1.26)
기타				
가공육 섭취	4	335,240	3,001	1.09 (0.96–1.24)
붉은 고기	8	1,417,470	6,936	1.27 (1.08–1.48)



RR > 1 = 방광암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes