
방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 C	2	4,359	831	0.68 (0.43-1.07)
비타민 E	3	36,672	978	0.80 (0.60-1.05)
비타민 B군				
비타민 B1	2	533,488	3,237	0.91 (0.52-1.60)
과일 및 채소				
콩류	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
아보카도	2	112,328	110	0.78 (0.60-1.01)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
발효식품	2	82,627	665	0.62 (0.48-0.80)
대사산물 및 아미노산				
식물성 단백질 섭취	2	903,751	2,856	0.82 (0.72-0.93)
식사 패턴				
DASH 식단	3	187,282	380	0.61 (0.30-1.23)
지중해식 식단	6	1,536,289	8,379	0.86 (0.77-0.97)
기타				
통곡물 섭취	3	576,212	3,892	0.72 (0.52-1.01)
유제품	6	186,061	2,176	0.78 (0.53-1.13)
총 식이섬유 섭취	2	676,447	3,990	0.85 (0.76-0.95)
알코올	8	950,368	6,562	0.94 (0.79-1.12)



RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes