
신장 및 신우암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
베타-카로틴	5	881,922	4,765	0.76 (0.64-0.90)
루테인	4	879,626	3,623	0.80 (0.69-0.91)
라이코펜	3	873,444	2,860	0.84 (0.59-1.22)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 A	2	4,597	1,909	0.66 (0.44-0.99)
비타민 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45-0.99)
비타민 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61-0.94)
비타민 D	8	510,406	3,672	0.85 (0.61-1.19)
비타민 B군				
비타민 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47-0.85)
엽산	6	132,098	3,299	0.65 (0.48-0.89)
비타민 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55-0.92)
비타민 B6	4	4,771	2,002	0.74 (0.52-1.04)
비타민 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68-1.04)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	2	3,471	1,543	0.26 (0.08-0.92)
칼슘	2	2,274	931	0.62 (0.16-2.39)
폴리페놀 및 플라보노이드				
녹차	2	103,012	536	0.51 (0.24-1.11)
차	5	907,106	3,147	0.73 (0.56-0.96)
지방산 및 지질				
다중불포화지방(PUFA)	2	86,364	1,029	0.88 (0.29-2.66)
대사산물 및 아미노산				
콜린	2	616,865	2,286	0.94 (0.84-1.06)
기타				
알코올	24	4,606,074	15,007	0.84 (0.76-0.93)
총 식이섬유 섭취	3	198,798	2,632	0.87 (0.78-0.97)



RR < 1 = 신장 및 신우암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes