
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine D	3	327,723	1,577	*1.15 (0.58-2.30)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Koper	2	95,958	353	*2.44 (0.43-13.84)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.76-2.24)*
OVERIG				
Inname van met suiker gezoete dranken	3	563,999	1,503	*1.11 (0.96-1.28)*
Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen	2	582,035	3,740	*1.22 (1.03-1.45)*
Inname van bewerkt vlees	3	991,425	2,649	*1.23 (1.05-1.44)*
Rood vlees	4	986,845	3,043	*1.75 (1.22-2.53)*
Zuivel	3	3,506	1,009	*2.76 (1.23-6.20)*



Blootstellingsgroep

Vitaminen A, C, D, E en K | Mineralen en sporenelementen | Metabolieten en aminozuren | Overig

RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes