Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.75-2.25)*
OVERIG				
Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen	2	582,035	3,740	*1.22 (1.03-1.45)*
Inname van bewerkt vlees	3	991,425	2,649	*1.23 (1.05-1.44)*
Rood vlees	4	986,845	3,043	*1.75 (1.21-2.52)*
Zuivel	3	3,506	1,009	*2.72 (1.22-6.05)*



Blootstellingsgroep
Metabolieten en aminozuren
Overig

RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes