
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine C	2	4,359	831	*0.68 (0.43-1.07)*
Vitamine E	3	36,672	978	*0.80 (0.60-1.05)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	533,488	3,237	*0.91 (0.52-1.60)*
FRUIT EN GROENTEN				
Peulvruchten	2	2,541	1,268	*0.64 (0.43-0.95)*
Avocado	2	112,328	110	*0.78 (0.60-1.01)*
GEFERMENTEERDE VOEDING EN PROBIOTICA				
Gefermenteerde voedingsmiddelen	2	82,627	665	*0.62 (0.48-0.80)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Inname van plantaardige eiwitten	2	903,751	2,856	*0.82 (0.72-0.93)*
VOEDINGSPATRONEN				
DASH-dieet	3	187,282	380	*0.61 (0.30-1.23)*
Mediterraan dieet	6	1,536,289	8,379	*0.86 (0.77-0.97)*
OVERIG				
Inname van volkorenproducten	3	576,212	3,892	*0.72 (0.52-1.01)*
Zuivel	6	186,061	2,176	*0.78 (0.53-1.13)*
Totale inname van voedingsvezels	2	676,447	3,990	*0.85 (0.76-0.95)*
Alcohol	8	950,368	6,562	*0.94 (0.79-1.12)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes