
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Bètacaroteen	5	881,922	4,765	*0.75 (0.64-0.90)*
Luteïne	4	879,626	3,623	*0.80 (0.69-0.91)*
Lycopeen	3	873,444	2,860	*0.84 (0.59-1.22)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine A	2	4,597	1,909	*0.65 (0.43-0.99)*
Vitamine E	4	127,855	2,404	*0.67 (0.45-0.99)*
Vitamine C	5	128,222	2,559	*0.76 (0.61-0.94)*
Vitamine D	2	4,113	1,544	*0.79 (0.65-0.95)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*0.71 (0.55-0.92)*
Foliumzuur	3	129,691	2,345	*0.78 (0.64-0.96)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	4	804,643	2,861	*0.72 (0.52-1.01)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)	2	86,364	1,029	*0.88 (0.29-2.67)*
OVERIG				
Alcohol	16	3,497,583	8,299	*0.80 (0.74-0.86)*
Totale inname van voedingsvezels	2	4,410	1,621	*0.85 (0.64-1.12)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes