
# 与肾和肾盂癌风险呈正相关的暴露因素

| 暴露因素 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **矿物质与微量元素** | | | | |
| 铜 | 2 | 95,958 | 353 | 2.44 (0.43–13.84) |
| **代谢物与氨基酸** | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76–2.24) |
| **其他** | | | | |
| 含糖饮料摄入量 | 3 | 563,999 | 1,503 | 1.11 (0.96–1.28) |
| 超加工食品摄入量 | 2 | 582,035 | 3,740 | 1.22 (1.03–1.45) |
| 加工肉类摄入量 | 3 | 991,425 | 2,649 | 1.23 (1.05–1.44) |
| 红肉 | 4 | 986,845 | 3,043 | 1.75 (1.22–2.53) |
| 乳制品 | 3 | 3,506 | 1,009 | 2.76 (1.23–6.20) |




暴露类别
矿物质与微量元素　代谢物与氨基酸　其他

RR > 1 = 与肾和肾盂癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes