
# 与膀胱癌风险呈负相关的暴露因素

| 暴露因素 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **类胡萝卜素** | | | | |
| β-胡萝卜素 | 2 | 57,269 | 1,178 | 0.69 (0.45–1.08) |
| **维生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 维生素 A | 2 | 1,442 | 648 | 0.56 (0.41–0.76) |
| 维生素 C | 2 | 4,359 | 831 | 0.68 (0.43–1.07) |
| 维生素 D | 8 | 338,611 | 3,073 | 0.87 (0.40–1.90) |
| 维生素 E | 4 | 37,447 | 1,364 | 0.90 (0.85–0.96) |
| **B 族维生素** | | | | |
| 叶酸 | 2 | 2,508 | 1,233 | 0.65 (0.36–1.17) |
| 维生素 B1 | 2 | 533,488 | 3,237 | 0.91 (0.52–1.60) |
| **矿物质与微量元素** | | | | |
| 硒 | 6 | 158,571 | 1,885 | 0.79 (0.60–1.05) |
| **水果与蔬菜** | | | | |
| 豆类 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43–0.95) |
| 牛油果 | 2 | 112,328 | 110 | 0.78 (0.60–1.01) |
| **发酵食品与益生菌** | | | | |
| 发酵食品 | 2 | 82,627 | 665 | 0.62 (0.48–0.80) |
| **代谢物与氨基酸** | | | | |
| 植物蛋白质摄入量 | 2 | 903,751 | 2,856 | 0.82 (0.72–0.93) |
| **饮食模式** | | | | |
| DASH饮食 | 3 | 187,282 | 380 | 0.61 (0.30–1.23) |
| 地中海饮食 | 6 | 1,536,289 | 8,379 | 0.86 (0.77–0.97) |
| **其他** | | | | |
| 全谷物摄入量 | 3 | 576,212 | 3,892 | 0.72 (0.52–1.01) |
| 乳制品 | 6 | 186,061 | 2,176 | 0.78 (0.53–1.13) |
| 总膳食纤维摄入量 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.76–0.95) |
| 酒精 | 8 | 950,368 | 6,562 | 0.94 (0.79–1.12) |




RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes