
# 신세포암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인

| 노출 요인 | 추정치 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **카로티노이드** | | | | |
| 라이코펜 | 3 | 873,444 | 2,860 | 1.02 (0.73–1.42) |
| **비타민 A, C, D, E, K** | | | | |
| 비타민 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.23 (0.53–2.87) |
| **대사산물 및 아미노산** | | | | |
| 식이 단백질 섭취 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.75–2.25) |
| **기타** | | | | |
| 가공육 섭취 | 6 | 1,766,660 | 5,212 | 1.15 (0.94–1.41) |
| 붉은 고기 | 6 | 1,768,446 | 5,800 | 1.43 (1.13–1.81) |
| 유제품 | 3 | 3,506 | 1,009 | 2.72 (1.22–6.05) |




RR > 1 = 신세포암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: No