
# Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***CAROTENOÏDEN*** | | | | |
| **Lycopeen** | 3 | 873,444 | 2,860 | *1.02 (0.73-1.42)* |
| ***VITAMINEN A, C, D, E EN K*** | | | | |
| **Vitamine A** | 2 | 4,597 | 1,909 | *1.23 (0.53-2.87)* |
| ***METABOLIETEN EN AMINOZUREN*** | | | | |
| **Eiwitinname via de voeding** | 2 | 776,349 | 2,168 | *1.30 (0.75-2.25)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van bewerkt vlees** | 6 | 1,766,660 | 5,212 | *1.15 (0.94-1.41)* |
| **Rood vlees** | 6 | 1,768,446 | 5,800 | *1.43 (1.13-1.81)* |
| **Zuivel** | 3 | 3,506 | 1,009 | *2.72 (1.22-6.05)* |




Blootstellingsgroep

Carotenoïden · Vitaminen A, C, D, E en K · Metabolieten en aminozuren · Overig

*RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Include subexposures: No