
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Bètacaroteen	5	881,922	4,765	*0.76 (0.64-0.90)*
Luteïne	5	881,922	4,765	*0.77 (0.68-0.87)*
Zeaxanthine	2	781,129	2,616	*0.79 (0.67-0.93)*
Lycopeen	3	873,444	2,860	*0.84 (0.59-1.22)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	4	127,855	2,404	*0.67 (0.45-0.99)*
Vitamine C	5	128,222	2,559	*0.76 (0.61-0.94)*
Vitamine D	2	4,112	776	*0.79 (0.66-0.95)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	2	4,597	1,909	*0.74 (0.52-1.05)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Groene thee	2	103,012	536	*0.51 (0.24-1.11)*
Thee	5	907,106	3,147	*0.73 (0.56-0.95)*
OVERIG				
Alcohol	29	14,497,576	30,798	*0.78 (0.71-0.84)*
Totale inname van voedingsvezels	3	198,798	2,632	*0.87 (0.78-0.97)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: No