
# Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***CAROTENOÏDEN*** | | | | |
| **Luteïne** | 5 | 881,922 | 4,765 | *0.77 (0.68-0.87)* |
| **Zeaxanthine** | 2 | 781,129 | 2,616 | *0.79 (0.67-0.93)* |
| **Bètacaroteen** | 5 | 881,922 | 4,765 | *0.98 (0.70-1.36)* |
| ***VITAMINEN A, C, D, E EN K*** | | | | |
| **Vitamine E** | 4 | 127,855 | 2,404 | *0.67 (0.45-0.99)* |
| **Vitamine C** | 5 | 128,222 | 2,559 | *0.76 (0.61-0.94)* |
| **Vitamine D** | 9 | 153,812 | 2,243 | *0.83 (0.68-1.00)* |
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Vitamine B12** | 2 | 1,959 | 730 | *0.63 (0.47-0.85)* |
| **Vitamine B1** | 2 | 4,597 | 1,909 | *0.71 (0.55-0.92)* |
| **Vitamine B6** | 3 | 3,861 | 1,547 | *0.74 (0.40-1.40)* |
| **Foliumzuur** | 6 | 84,212 | 3,088 | *0.76 (0.50-1.17)* |
| **Vitamine B2** | 3 | 3,861 | 1,547 | *0.84 (0.68-1.04)* |
| ***MINERALEN EN SPORENELEMENTEN*** | | | | |
| **Seleen** | 2 | 3,471 | 1,543 | *0.53 (0.04-7.15)* |
| **Calcium** | 2 | 2,273 | 154 | *0.62 (0.16-2.40)* |
| ***POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN*** | | | | |
| **Thee** | 4 | 804,643 | 2,861 | *0.71 (0.51-1.00)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Alcohol** | 21 | 3,783,725 | 11,677 | *0.73 (0.67-0.80)* |
| **Totale inname van voedingsvezels** | 2 | 4,410 | 1,621 | *0.85 (0.64-1.12)* |




*RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Include subexposures: No