
与肾细胞癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	881,922	4,765	0.77 (0.68–0.87)
玉米黄质	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
β-胡萝卜素	5	881,922	4,765	0.98 (0.70–1.36)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
维生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
维生素 D	9	153,812	2,243	0.83 (0.68–1.00)
B 族维生素				
维生素 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47–0.85)
维生素 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55–0.92)
维生素 B6	3	3,861	1,547	0.74 (0.40–1.40)
叶酸	6	84,212	3,088	0.76 (0.50–1.17)
维生素 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68–1.04)
矿物质与微量元素				
硒	2	3,471	1,543	0.53 (0.04–7.15)
钙	2	2,273	154	0.62 (0.16–2.40)
多酚与黄酮类				
茶	4	804,643	2,861	0.71 (0.51–1.00)
其他				
酒精	21	3,783,725	11,677	0.73 (0.67–0.80)
总膳食纤维摄入量	2	4,410	1,621	0.85 (0.64–1.12)



RR < 1 = 与肾细胞癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No