
# 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關的暴露因子
## 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.23 (0.53–2.84) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 維生素 B1 | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.07 (0.51–2.23) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 銅 | 2 | 95,958 | 353 | 2.44 (0.43–13.84) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76–2.24) |
| **其他** | | | | |
| 含糖飲料攝取量 | 3 | 563,999 | 1,503 | 1.11 (0.96–1.28) |
| 加工肉類攝取量 | 6 | 1,766,660 | 5,212 | 1.15 (0.94–1.41) |
| 紅肉 | 6 | 1,768,446 | 5,800 | 1.43 (1.13–1.82) |
| 乳製品 | 4 | 19,420 | 1,051 | 2.22 (1.24–3.97) |




RR > 1 = 與腎臟及腎盂癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No