
# 신장 및 신우암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 추정치 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **카로티노이드** | | | | |
| 베타-카로틴 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.76 (0.64-0.90) |
| 루테인 | 5 | 881,922 | 4,765 | 0.77 (0.68-0.87) |
| 제아잔틴 | 2 | 781,129 | 2,616 | 0.79 (0.67-0.93) |
| 라이코펜 | 3 | 873,444 | 2,860 | 0.84 (0.59-1.22) |
| **비타민 A, C, D, E, K** | | | | |
| 비타민 E | 4 | 127,855 | 2,404 | 0.67 (0.45-0.99) |
| 비타민 C | 5 | 128,222 | 2,559 | 0.76 (0.61-0.94) |
| 비타민 D | 2 | 4,112 | 776 | 0.79 (0.66-0.95) |
| **비타민 B군** | | | | |
| 엽산 | 2 | 4,597 | 1,909 | 0.74 (0.52-1.05) |
| **폴리페놀 및 플라보노이드** | | | | |
| 녹차 | 2 | 103,012 | 536 | 0.51 (0.24-1.11) |
| 차 | 5 | 907,106 | 3,147 | 0.73 (0.56-0.95) |
| **지방산 및 지질** | | | | |
| 다중불포화지방(PUFA) | 3 | 861,316 | 2,507 | 0.94 (0.52-1.71) |
| **기타** | | | | |
| 알코올 | 29 | 14,497,576 | 30,798 | 0.78 (0.71-0.84) |
| 총 식이섬유 섭취 | 3 | 198,798 | 2,632 | 0.87 (0.78-0.97) |




RR < 1 = 신장 및 신우암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes