
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Lycopeen	3	873,444	2,860	*1.02 (0.73-1.41)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine A	2	4,597	1,909	*1.22 (0.53-2.80)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	2	4,597	1,909	*1.17 (0.60-2.28)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	2	776,349	2,168	*1.30 (0.76-2.22)*
OVERIG				
Inname van bewerkt vlees	5	991,708	3,734	*1.13 (0.90-1.43)*
Rood vlees	4	986,845	3,043	*1.76 (1.22-2.54)*
Zuivel	3	3,506	1,009	*2.79 (1.24-6.32)*



Blootstellingsgroep

Carotenoïden · Vitaminen A, C, D, E en K · B-vitaminen · Metabolieten en aminozuren · Overig

RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: No