
与膀胱癌风险呈负相关的暴露因素

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	2	1,969	940	0.52 (0.32–0.82)
β-胡萝卜素	4	243,154	1,759	0.74 (0.59–0.91)
番茄红素	2	101,940	858	0.95 (0.90–0.99)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 A	2	4,914	351	0.59 (0.40–0.88)
维生素 C	2	4,359	831	0.68 (0.44–1.07)
维生素 E	2	1,785	754	0.70 (0.50–0.98)
维生素 D	10	339,695	9,964	0.75 (0.35–1.61)
B 族维生素				
叶酸	4	188,393	1,814	0.72 (0.54–0.95)
维生素 B1	3	403,230	1,548	0.97 (0.87–1.08)
矿物质与微量元素				
硒	7	161,335	3,086	0.76 (0.56–1.03)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
牛油果	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
发酵食品与益生菌				
酸奶	2	101,981	906	0.65 (0.25–1.65)
发酵食品	3	203,114	2,164	0.66 (0.55–0.80)
脂肪酸与脂质				
Omega-3 脂肪酸	2	1,061	572	0.31 (0.20–0.48)
代谢物与氨基酸				
植物蛋白质摄入量	3	903,751	2,856	0.83 (0.73–0.94)
其他				
全谷物摄入量	3	219,042	5,247	0.73 (0.52–1.01)
乳制品	8	306,953	3,788	0.74 (0.54–1.01)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.77–0.95)
酒精	7	491,062	5,809	0.86 (0.71–1.04)



RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No