
# 與腎細胞癌風險呈正相關的暴露因子
## 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| 茄紅素 | 3 | 873,444 | 2,860 | 1.02 (0.73–1.41) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 A | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.22 (0.53–2.80) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 葉酸 | 2 | 4,597 | 1,909 | 1.17 (0.60–2.28) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 776,349 | 2,168 | 1.30 (0.76–2.22) |
| **其他** | | | | |
| 加工肉類攝取量 | 5 | 991,708 | 3,734 | 1.13 (0.90–1.43) |
| 紅肉 | 4 | 986,845 | 3,043 | 1.76 (1.22–2.54) |
| 乳製品 | 3 | 3,506 | 1,009 | 2.79 (1.24–6.32) |




RR > 1 = 與腎細胞癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No