
방광암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인
식이 섭취 연구의 메타분석

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
베타-카로틴	3	241,442	903	0.79 (0.65-0.95)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 C	2	4,359	831	0.68 (0.44-1.07)
비타민 E	2	1,785	754	0.70 (0.50-0.98)
비타민 B군				
엽산	3	186,745	990	0.64 (0.41-1.01)
비타민 B1	3	403,230	1,548	0.97 (0.87-1.08)
과일 및 채소				
콩류	2	2,541	1,268	0.64 (0.43-0.95)
아보카도	2	112,328	1,165	0.78 (0.60-1.01)
발효 식품 및 프로바이오틱스				
요구르트	2	101,981	906	0.65 (0.25-1.65)
발효식품	3	203,114	2,164	0.66 (0.55-0.80)
대사산물 및 아미노산				
식물성 단백질 섭취	3	903,751	2,856	0.83 (0.73-0.94)
기타				
통곡물 섭취	3	219,042	5,247	0.73 (0.52-1.01)
유제품	8	306,953	3,788	0.74 (0.54-1.01)
총 식이섬유 섭취	2	676,447	3,990	0.85 (0.77-0.95)
알코올	6	490,657	5,696	0.86 (0.71-1.05)



RR < 1 = 방광암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes