
Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	8	576,384	17,242	*1.01 (0.81-1.26)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Eiwitinname via de voeding	3	903,751	2,856	*1.02 (0.85-1.23)*
Inname van dierlijke eiwitten	3	903,751	2,856	*1.14 (1.03-1.26)*
OVERIG				
Inname van bewerkt vlees	7	938,913	14,310	*1.09 (0.98-1.20)*
Rood vlees	9	1,417,360	6,876	*1.32 (1.11-1.57)*
Eieren	2	1,995	355	*3.68 (2.59-5.24)*



Blootstellingsgroep
Polyfenolen en flavonoïden
Metabolieten en aminozuren
Overig

RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op blaaskanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen

Include subexposures: Yes