
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Bètacaroteen	3	241,442	903	*0.79 (0.65-0.95)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine C	2	4,359	831	*0.68 (0.44-1.07)*
Vitamine E	2	1,785	754	*0.70 (0.50-0.98)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	3	186,745	990	*0.64 (0.41-1.01)*
Vitamine B1	3	403,230	1,548	*0.97 (0.87-1.08)*
FRUIT EN GROENTEN				
Peulvruchten	2	2,541	1,268	*0.64 (0.43-0.95)*
Avocado	2	112,328	1,165	*0.78 (0.60-1.01)*
GEFERMENTEERDE VOEDING EN PROBIOTICA				
Yoghurt	2	101,981	906	*0.65 (0.25-1.65)*
Gefermenteerde voedingsmiddelen	3	203,114	2,164	*0.66 (0.55-0.80)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Inname van plantaardige eiwitten	3	903,751	2,856	*0.83 (0.73-0.94)*
OVERIG				
Inname van volkorenproducten	3	219,042	5,247	*0.73 (0.52-1.01)*
Zuivel	8	306,953	3,788	*0.74 (0.54-1.01)*
Totale inname van voedingsvezels	2	676,447	3,990	*0.85 (0.77-0.95)*
Alcohol	6	490,657	5,696	*0.86 (0.71-1.05)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes