
# 与膀胱癌风险呈正相关的暴露因素

| 暴露因素 | 估计值数 | 样本量 | 病例数 | 合并 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **多酚与黄酮类** | | | | |
| 茶 | 8 | 576,384 | 17,242 | 1.01 (0.81–1.26) |
| **代谢物与氨基酸** | | | | |
| 膳食蛋白质摄入量 | 3 | 903,751 | 2,856 | 1.02 (0.85–1.23) |
| 动物蛋白质摄入量 | 3 | 903,751 | 2,856 | 1.14 (1.03–1.26) |
| **其他** | | | | |
| 加工肉类摄入量 | 7 | 938,913 | 14,310 | 1.09 (0.98–1.20) |
| 红肉 | 9 | 1,417,360 | 6,876 | 1.32 (1.11–1.57) |
| 鸡蛋 | 2 | 1,995 | 355 | 3.68 (2.59–5.24) |




RR > 1 = 与膀胱癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠

Include subexposures: Yes