
# 與膀胱癌風險呈負相關的暴露因子

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| 葉黃素 | 2 | 1,969 | 940 | 0.52 (0.32–0.82) |
| β-胡蘿蔔素 | 4 | 243,154 | 1,759 | 0.74 (0.59–0.91) |
| 茄紅素 | 2 | 101,940 | 858 | 0.95 (0.90–0.99) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 A | 2 | 4,914 | 351 | 0.59 (0.40–0.88) |
| 維生素 C | 2 | 4,359 | 831 | 0.68 (0.44–1.07) |
| 維生素 E | 2 | 1,785 | 754 | 0.70 (0.50–0.98) |
| 維生素 D | 10 | 339,695 | 9,964 | 0.75 (0.35–1.61) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 葉酸 | 4 | 188,393 | 1,814 | 0.72 (0.54–0.95) |
| 維生素 B1 | 3 | 403,230 | 1,548 | 0.97 (0.87–1.08) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 硒 | 7 | 161,335 | 3,086 | 0.76 (0.56–1.03) |
| **水果與蔬菜** | | | | |
| 豆類 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43–0.95) |
| 酪梨 | 2 | 112,328 | 1,165 | 0.78 (0.60–1.01) |
| **發酵食品與益生菌** | | | | |
| 優格 | 2 | 101,981 | 906 | 0.65 (0.25–1.65) |
| 發酵食品 | 3 | 203,114 | 2,164 | 0.66 (0.55–0.80) |
| **脂肪酸與脂質** | | | | |
| Omega-3 脂肪酸 | 2 | 1,061 | 572 | 0.31 (0.20–0.48) |
| 多元不飽和脂肪（PUFA） | 2 | 1,061 | 572 | 0.41 (0.25–0.68) |
| Omega-6 脂肪酸 | 2 | 1,061 | 572 | 0.46 (0.31–0.69) |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 2 | 547,683 | 2,981 | 0.88 (0.36–2.16) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 植物性蛋白質攝取量 | 3 | 903,751 | 2,856 | 0.83 (0.73–0.94) |
| **其他** | | | | |
| 全穀物攝取量 | 3 | 219,042 | 5,247 | 0.73 (0.52–1.01) |
| 乳製品 | 8 | 306,953 | 3,788 | 0.74 (0.54–1.01) |
| 總膳食纖維攝取量 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.77–0.95) |
| 酒精 | 7 | 491,062 | 5,809 | 0.86 (0.71–1.04) |




暴露類別

類胡蘿蔔素 | 維生素 A、C、D、E、K | B 群維生素 | 礦物質與微量元素 | 水果與蔬菜 | 發酵食品與益生菌 | 脂肪酸與脂質 | 代謝物與胺基酸 | 其他

RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes