
# Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker
## Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***VITAMINEN A, C, D, E EN K*** | | | | |
| **Vitamine C** | 2 | 4,359 | 831 | *0.68 (0.44-1.07)* |
| **Vitamine E** | 2 | 1,785 | 754 | *0.70 (0.50-0.98)* |
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Vitamine B1** | 3 | 403,230 | 1,548 | *0.97 (0.87-1.08)* |
| ***FRUIT EN GROENTEN*** | | | | |
| **Peulvruchten** | 2 | 2,541 | 1,268 | *0.64 (0.43-0.95)* |
| **Avocado** | 2 | 112,328 | 1,165 | *0.78 (0.60-1.01)* |
| ***GEFERMENTEERDE VOEDING EN PROBIOTICA*** | | | | |
| **Yoghurt** | 2 | 101,981 | 906 | *0.65 (0.25-1.65)* |
| **Gefermenteerde voedingsmiddelen** | 3 | 203,114 | 2,164 | *0.66 (0.55-0.80)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van volkorenproducten** | 2 | 1,486 | 678 | *0.55 (0.23-1.33)* |
| **Zuivel** | 8 | 306,953 | 3,788 | *0.74 (0.54-1.01)* |
| **Totale inname van voedingsvezels** | 2 | 676,447 | 3,990 | *0.85 (0.77-0.95)* |
| **Alcohol** | 6 | 490,657 | 5,696 | *0.91 (0.77-1.08)* |




*RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op blaaskanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen*

Include subexposures: No